



HITOS DEL DESARROLLO SEGUIMIENTO ADECUADO DE SUS PEQUEÑOS PACIENTES

La infancia y la niñez son periodos dinámicos de crecimiento y cambio.¹

Hitos del desarrollo

El desarrollo y el crecimiento físico proceden en un patrón secuencial y predecible que está intrínsecamente determinado.¹

POR EJEMPLO, DE LOS 8 A LOS 12 MESES:



Iniciará la dentición, por lo que podría babear y masticar casi cualquier cosa²



La continuación de **oligosacáridos de la leche humana**, puede ayudar a **proteger su barrera intestinal**³



Podrá tomar objetos con las manos y llevárselos a la boca²



Los probióticos pueden ayudar a evitar la colonización de bacterias patógenas en el intestino⁴



Tendrá la fuerza suficiente para sentarse por sí mismo²



Una **proteína adecuada en calidad y cantidad** podrá beneficiar su desarrollo⁵

NAN[®] 2 Optimal PRO, con una combinación exclusiva de **proteína OPTIPRO[®]**, **HMOs** y probiótico **L. Reuteri**, además de los **micronutrientes necesarios** que apoyan la **salud digestiva**.



INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.
Queda prohibida su reproducción y/o distribución parcial o total al público en general.

NOTA IMPORTANTE: Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenido hasta los dos años de edad. También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informales que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil. A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios. La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

EL USO DE ESTE PRODUCTO DEBE HACERSE BAJO ORIENTACIÓN DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD (MÉDICO O NUTRIÓLOGO). UTILÍCESE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA. MARCAS REGISTRADAS USADAS BAJO LICENCIA DE SU TITULAR SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CASE POSTALE 353, 1800 VEVEY, SUIZA.

Referencias:

1. Gerber R, et al. Developmental Milestones: Motor Development. Pediatrics in Review. 2010;31(7):267-277. 2. Infant and toddler health. Mayo Clinic. Consultado el 05.07.2022 en: <https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/infant-and-toddler-health/in-depth/infant-development/art-20047086>. 3. Reverri EJ, Devitt AA, Kajzer JA, Baggs GE, Borschel MW. Review of the Clinical Experiences of Feeding Infants Formula Containing the Human Milk Oligosaccharide 2'-Fucosyllactose. Nutrients. 2018;10(10):1346. 4. Mu Q, Tavella VJ, Luo XM. Role of Lactobacillus reuteri in Human Health and Diseases. Front Microbiol. 2018;9:757. 5. Macé K, Steenhout P, Klassen P, Donnet A. Protein quality and quantity in cow's milk-based formula for healthy term infants: past, present and future. Nestle Nutr Workshop Ser Pediatr Program. 2006;58:189-203

