

Escala de heces de Bristol



Pedazos separados y duros, difíciles de defecar, como semillas o nueces.



Forma de salchicha con grumos o fragmentos.




Forma de salchicha con grietas en la superficie.



Forma de culebra, blanda y suave.



Trozos suaves con bordes definidos, fáciles de defecar.



Trozos esponjosos y blandos con bordes irregulares.



Consistencia aguada, sin trozos, totalmente líquida.



Referencias: 1. Bristol Stool Chart/Spanish. Seattle Children's Hospital. Educación para el paciente y la familia | Medicina de Reconstrucción Pélvica. 2. 2. Guías de diagnóstico y tratamiento del estreñimiento en México. Evaluación y tratamiento del estreñimiento en población pediátrica. Rev Gastroenterol Mex, Vol 76, Núm. 2, 2011; 2 (76):155- 168. 3. Escudero E, Gonzáles P: La fibra dietética. Nutr. Hosp 2006, 21:61-72. 4. Costalos C, Kapiki A, Apostolou M, Papatoma E. The effect of a prebiotic supplemented formula on growth and stool microbiology of term infants Early Hum Dev. 2008 Jan;84(1):45-9.

NOTA IMPORTANTE: Creemos que la lactancia materna es el comienzo nutricional ideal para los bebés, ya que la leche materna proporciona una dieta equilibrada y protección contra enfermedades para el bebé. Apoyamos plenamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, seguida de la introducción de alimentos complementarios nutritivos adecuados junto con la lactancia materna sostenida hasta los dos años de edad.

También reconocemos que la lactancia materna no siempre es una opción para los padres. Recomendamos a los profesionales de la salud que informen a los padres sobre las ventajas de la lactancia materna. Si los padres consideran no amamantar, los profesionales de la salud deben informarles que tal decisión puede ser difícil de revertir y que la introducción de la alimentación parcial con biberón reducirá el suministro de leche materna. Los padres deben considerar las implicaciones sociales y financieras del uso de fórmula infantil.

A medida que los bebés crecen a ritmos diferentes, los profesionales de la salud deben aconsejar sobre el momento adecuado para que el bebé comience a comer alimentos complementarios.

La fórmula para lactantes y los alimentos complementarios siempre deben prepararse, usarse y almacenarse según las instrucciones de la etiqueta para evitar riesgos para la salud del bebé.

NW061-2 NANESP-HCP DIG-320211

INFORMACIÓN EXCLUSIVA PARA EL PROFESIONAL DE LA SALUD.

© MARCAS REGISTRADAS USADAS BAJO LICENCIA DE SU TITULAR, SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., CASE POSTALE 353, VEVEY, SUIZA.